

CERNÍCALO VULGAR (*Falco tinnunculus*)



IDENTIFICACIÓN

Pequeña rapaz (unos 34 cm de longitud pico-cola y 69-78 cm de envergadura alar) de característica silueta en vuelo. Cola larga y alas largas y acabadas en punta. Presenta dimorfismo sexual acusado: los machos tienen cabeza y cola gris, con franja negra y borde blanco al final de ésta, y el dorso castaño salpicado de pequeñas motas negras; las hembras son pardas moteadas de oscuro y con barreado transversal en la cola. En ambas las partes inferiores son claras. Los jóvenes son parecidos a las hembras, más rayados ventralmente. Pico típico de halcón, corto y curvado. Presenta una débil bigotera negra a ambos lados de éste. Su canto característico (ki-ki-ki-ki-ki) lo emite especialmente cuando es alarmado cerca del nido.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Falconiformes	Falcónidos	<i>Falco</i>	<i>F. tinnunculus</i>



Cernícalo posado en cable

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

El hábitat de cría en nuestro municipio lo constituyen los cortados rocosos, los taludes de ramblas y casas de campo en ruinas, pero se alimenta principalmente en áreas abiertas con cultivos. Es la rapaz diurna ibérica más abundante, común y de frecuente observación en el campo. A menudo se encuentra posado en postes, cables, torretas, árboles o edificios. Distribuido por todo el término, aparece en la mayoría de parajes serranos y esteparios: Sierras Oliva, Lácer y del Cuchillo, La Toconera, Cerro Carriles, varias ramblas (Cañizar, Honda), áreas esteparias del oeste (Casa Alarcón, Los Cuadrones) y noreste (La Mora, El Derramador), casas abandonadas e incluso en alguna cantera (Cabezo del Rosario). No se ha hecho un censo de la especie en el término, pero se han localizado 7 parejas reproductoras (5 en cortados, 1 en rambla y 1 en casa de campo) a lo largo de los años de observaciones personales. Trasladando el dato de densidad media para esta especie de un trabajo realizado en el vecino altiplano murciano de Jumilla-Yecla (Martínez et al. 1990), a la superficie de Caudete le corresponderían unas 10 parejas.



BIOLOGÍA

Ave sedentaria, observable todo el año. Cría en huecos de cortados rocosos, taludes de ramblas y casas abandonadas, incluso utilizando nidos de otras aves (principalmente de córvidos). El periodo de cría transcurre entre abril y junio, fechas en que se han encontrado los nidos ocupados o las parejas defendiendo el territorio de cría. En vuelo puede acosar e intimidar a otras aves mucho mayores, especialmente en esa época, dándoles rápidas pasadas en vuelo, alejándolas de la zona del nido (ataques observados en Caudete a chova piquirroja, cuervo y águila real). Su forma de prospectar el terreno en vuelo cuando caza le ha dado el nombre, al cernirse en el aire, manteniéndose quieto mientras bate las alas rápidamente y con la cola abierta en abanico. Desde esa posición se deja caer sobre la presa. También puede cazar desde una atalaya (postes, cables, ramas, edificios, ...). Sus presas son insectos y pequeños vertebrados.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "de interés especial" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).