

TÓRTOLA TURCA

(*Streptopelia decaocto*)



IDENTIFICACIÓN

Ave de aspecto de paloma delgada y esbelta, de 29-33 cm de longitud desde el pico a la cola y 48-53 cm de envergadura. Plumaje de aspecto muy liso, sin apenas contrastes, pardo grisáceo pálido, más claro en las partes ventrales, con ligeros tonos rosados. Característica franja negra en el cuello que no cierra por delante de éste, a modo de semicollar, no presente en los jóvenes. Pico oscuro. Cola larga, con un diseño de banda subterminal negra y banda terminal blanca, muy visible en vuelo y característico en las tórtolas; en esta especie está poco contrastado dorsalmente. Patas rojizas. Canto más agudo y fuerte que el de la paloma, repetitivo, de tipo “tu-tuuuu-tu” (tres partes, la segunda más larga y acentuada). También emite un sonido en vuelo que recuerda un balido tembloroso, agudo y nasal “breeeee...”. La coloración del plumaje, la línea única del cuello, el tamaño ligeramente mayor y el canto la distinguen de la tórtola europea o común (*Streptopelia turtur*).

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Columbiformes	Colúmbidos	<i>Streptopelia</i>	<i>S. decaocto</i>



Pareja de tórtolas turcas en pino carrasco

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Ha ocupado ciudades y pueblos tras su rápida expansión desde el este de Europa y Asia. Aparece también en el medio agrícola, siempre asociada a la proximidad humana. Normalmente en el medio urbano se la ve en edificios, posada en antenas o cables, y en jardines o zonas con arbolado, posada en grandes árboles. En el medio agrario se ve posada en vallados de embalses de riego o de recintos con animales domésticos. Esta especie apareció en la Península Ibérica hace pocas décadas, colonizando nuevas zonas y ampliando su área de distribución (de hecho, en los mapas de distribución de guías ornitológicas de entonces no aparecía la tórtola turca en nuestra geografía). La primera cita personal en la que anoto esta especie en Caudete figura en 1994. Bastante frecuente su observación. En el término municipal abunda en la población, incluida la zona industrial, en el diseminado de casas de campo, granjas, pequeños pinares, cultivos diversos (frutales, almendros, nogales, olivos, viñedos), ...



BIOLOGÍA

Ave residente, observable todo el año, reproductora en el término municipal, donde hay localizados nidos en pinos carrascos. También puede situar los nidos en cornisas de edificios. El nido está hecho de ramitas, poco elaborado. Puede criar varias veces al año entre marzo-abril y septiembre-octubre, poniendo 2 huevos. Incuba unos 15 días y los pollos están en el nido unas tres semanas. Principalmente granívora, acepta también insectos, moluscos, gusanos o cualquier resto de comida. Aprovecha el alimento almacenado o suministrado al ganado. Generalmente se observa en parejas o, cuando hay una fuente de alimento, en pequeños grupos.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie no protegida (no recogida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha).