

ALCARAVÁN

(*Burhinus oedicnemus*)



IDENTIFICACIÓN

Ave de 40-45 cm de longitud pico-cola y 77-85 cm de envergadura alar, de plumaje críptico, marrón claro arenoso con estrías negras, ventralmente más pálido. Cabeza grande redondeada, con grandes ojos amarillos. Pico no muy largo, fuerte, amarillo con punta negra. Banda blanca bordeada de negro en el ala plegada. Patas largas y gruesas, amarillas. Su huella en arena u otro terreno blando resulta inconfundible por la disposición de los tres dedos dirigidos hacia delante, sin marcarse ninguno hacia atrás. En vuelo, a no mucha altura, llama la atención la forma arqueada de las largas alas y la coloración dorsal de éstas, blanca y negra. Fácil de detectar por su canto característico, que emite principalmente al final de la tarde y de noche, un agudo “trr-lííí, trr-lííí, trr-lííí...”. También se conoce popularmente como “chorlito”.

ENCUADRE TAXONÓMICO


| Clase | Orden | Familia | Género | Especie |
|-------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Aves | Caradriformes | Burínidos | <i>Burhinus</i> | <i>B. oedicnemus</i> |



Uno de los hábitats agrícolas donde aparece el alcaraván

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

En el municipio aparece en zonas agrícolas: cultivos herbáceos, viñedos, almendros, olivares, barbechos, ... También en áreas con vegetación arbustiva baja y abierta, herbazales, incluso cerca de zonas industriales. En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), esta fue una de las especies de interés en la zona de Sierra del Cuchillo, Casa Alarcón y Los Cuadrones y en la de Sierra Lácer y La Toconera, aunque también se citaba en otros parajes no seleccionados como zonas de importancia por su todavía bajo muestreo: Entorno estepario de la carretera L-9 (de Montealegre) y Entorno de la rambla de Randero. Se añadió posteriormente toda la zona esteparia oriental (Los Villares, Las Encrucijadas, Bogarra, El Blanco) y occidental (límitrofe con Yecla, Herrada de Jacinto, El Cabezo, Casa Alarcón, Los Cuadrones, Altos del Temprano-El Portillo) (Cremades 2008). Puede ser más abundante de lo que en principio aparenta, al ser poco detectable durante el día. La población reproductora en el término se ha estimado en unas 7 a 17 parejas y la invernada en 80 a 145 individuos (Cremades 2008).



BIOLOGÍA

Ave sedentaria, observable todo el año. Crepuscular, activo al anochecer y durante la noche. Muy discreto durante el día, permanece inmóvil confiando en su camuflaje, o se desplaza semiagachado. Corre y se para a observar, inmóvil, cuando es descubierto, o realiza un vuelo corto a un lugar más alejado. Hace la puesta (2 huevos, a veces 3) en el suelo e incuba durante 25-27 días. Pollos nidífugos. Fuera de la época reproductora se reúne en pequeños grupos (el más numeroso se ha contado en invierno, con 17 individuos). Sus presas son básicamente invertebrados, pero puede capturar pequeños vertebrados.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "de interés especial" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).