

# FAUNA SILVESTRE DE CAUDETE

Fotografías y texto de Manuel Cremades García

FICHA 21

## SISÓN

(*Tetrax tetrax*)



## IDENTIFICACIÓN

Ave esbelta, de 40-45 cm de longitud y cerca de un metro de envergadura, con cuello y patas largos. El macho en época reproductora tiene cabeza gris azulado y cuello negro con dos bandas blancas, la superior en forma de V, muy llamativo, que puede dilatar ahuecando las plumas. Hembras y machos en invierno de coloración similar, muy discreta y mimética, marrón terroso en dorso, cuello y cabeza, con finas motas oscuras; recuerdan a perdices o hembras de faisán. En vuelo destaca la gran superficie blanca ventral y de las alas (éstas con extremos negros). Al volar produce un sonido “si-si-si-si” característico, que lo delata y le da nombre, producido por la menor longitud de la cuarta primaria del ala. En época de cría los machos emiten un sonido corto: “prek” o “prret”.

## ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Gruiformes	Otídeos	<i>Tetrax</i>	<i>T. tetrax</i>



Hábitat estepario en el que aparece el sisón

## HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Ave propia de estepas y áreas abiertas con cultivos herbáceos. En el municipio de Caudete se encuentra en llanuras agrícolas del extremo occidental, en terrenos en barbecho, pedregosos, con algunos almendros dispersos y pequeñas manchas de espartal. La zona de importancia para esta especie es el área esteparia limítrofe con Yecla (Cremades 2008). Los bandos observados en el término entre 2005 y 2014 han sido de entre 4 y 18 individuos. Las grandes y rápidas transformaciones en la zona occidental del término (viñedos en espaldera, nuevos árboles frutales y recintos para ganadería intensiva) pueden haber comprometido la distribución de esta especie al mermar y fraccionar las amplias planicies de secano que dominaban antes esta parte del término municipal (Cremades 2008).



## BIOLOGÍA

En Caudete sólo se ha observado en invierno e inicio de la primavera, aunque esta especie es residente en la Península Ibérica. Forma bandos en invierno (el mayor grupo visto en el término ha sido de 18 aves). Se desconoce si la especie es reproductora en el área. Para camuflarse se agacha o se queda quieto. Se desplaza con lentitud y con el cuello elevado, con mucha discreción. Es conocido su mecanismo de defensa al ser perseguido en vuelo por una rapaz, a la que arroja sus excrementos. Se alimenta de materia vegetal (semillas, brotes, hojas), pero en verano también insectos y otros pequeños invertebrados (caracoles, gusanos).

## PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y, en el seno de éste, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como especie "vulnerable", y catalogada "vulnerable" también en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).